



Wichtige Information zur Medikation vor Ihrer Operation

Stand: 05.05.2025

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Zur Durchführung Ihrer Operation ist es zwingend erforderlich, dass bestimmte Medikamente rechtzeitig abgesetzt bzw. pausiert werden. Bei Nichtbeachtung kann der operative Eingriff nicht zum geplanten Termin durchgeführt werden. Um das zu vermeiden, befolgen Sie unbedingt die Hinweise zu den Präparaten, die wir in der folgenden Liste aufgeführt haben. **Sprechen Sie hierzu bitte rechtzeitig mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin!**

Wirkstoff	Handelsname (Bsp.)	Information zum Pausieren/Aussetzen
Opiatantagonisten:		
Naltrexon	Adepend	10 Tage vor der OP pausieren Nehmen Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin.
Psychopharmaka:		
Lithium	Quilonum Retard Hypnorex Retard	72 Stunden vor der OP pausieren: bei Nierenschwäche mit erhöhtem Risiko für eine Überdosierung! Pausieren nicht erforderlich: Wenn kein erhöhtes Risiko für eine Überdosierung besteht! Nehmen Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin.
Tranlycypromin	Jatrosom	3 Monate vor der OP besprechen! Nehmen Sie rechtzeitig Rücksprache mit Ihrem Psychiater/Ihrer Psychiaterin! (Wenn möglich: Umstellung der Therapie, damit 14 Tage vor der OP Tranlycypromin pausiert werden kann) Gemeinsam setzen wir dann die Empfehlungen um.
Antidiabetika:		
Metformin	Glucophage Siofor Juformin Janumet	72 Stunden vor der OP pausieren
GLP-1-Agonisten bzw. GLP 1-/GIP-Agonisten (wöchentliche Gabe) Dulaglutid Semaglutid Tirzepatid	Trulicity Ozempic Wegovy Mounjaro	7 Tage vor der OP pausieren
SGLT2-Inhibitoren Monopräparate - Dapagliflozin - Empagliflozin - Ertugliflozin Kombinationen mit Metformin - Dapagliflozin/Metformin - Empagliflozin/Metformin	Forxiga Jardiance Steglatro Xigduo Steglujan Glyxambi	72 Stunden vor der OP pausieren

Wirkstoff	Handelsname (Bsp.)	Information zum Pausieren/Aussetzen
„Blutverdünner“:		
Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Ticlopidin	Plavix Iscover Efient Brilique	Das Vorgehen bei diesen Substanzen ist abhängig vom Grund der Einnahme. Nehmen Sie dazu Rücksprache mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin. Ein rechtzeitiges Pausieren vor der OP ist notwendig: Im Regelfall 10 Tage, je nach Wirkstoff
Rivaroxaban Edoxaban Apixaban	Xarelto Lixiana Eliquis	48 Stunden vor der OP pausieren
Dabigatran	Pradaxa	72 Stunden vor der OP pausieren
Phenprocoumon	Marcumar	Im Regelfall: 7-10 Tage vor der OP pausieren Manchmal ist die überlappende Gabe einer Heparin-Spritze erforderlich. Bitte besprechen Sie das genaue Vorgehen mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin!
Cilostazol		5 Tage vor der OP pausieren
Phytopharmaka: (pflanzliche Arzneimittel)		
Ginkgo Ginseng Knoblauch Johanniskraut (ohne Arztverordnung) Baldrian Kurkuma Bromelain	Gingium Tebonin Pharmaton Vital N Ilja Rogoff Kwai Jarsin Neuroplant Baldriparan Allunapret Wobenzym	3 Wochen vor der OP pausieren Ausnahme: Johanniskraut mit ärztlicher Verordnung Im Einzelfall kann diese Substanz weiterhin eingenommen werden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr Anästhesieteam im St.Josef-Stift